

吉克逆酸清涼口服懸浮液

Giko Antacid Fresh Oral Suspension

【說明】

本品於服用後在胃中與胃酸發生反應，形成一種酸鹼度幾近中性的飄浮黏膠，能有效阻止胃液逆流，因此可緩解因胃酸或膽汁逆流至食道所導致的症狀，如：消化不良、逆流性食道炎、反胃、上腹及胸骨後疼痛等。

1【成分】

1.1 有效成分及含量

每毫升含

有效成分及含量：

Sodium Alginate.....	50 毫克
Sodium Bicarbonate.....	26.7 毫克
Calcium Carbonate.....	16 毫克

(本藥品每10毫升劑量中鈉含量為5.7 mEq，單次劑量之鈉含量為5.7~11.4 mEq)

1.2 其他成分(賦形劑)：Carbomer 934P、Sodium Saccharin、Methylparaben、Propylparaben、Peppermint Oil、Sodium Hydroxide、Purified Water

2【用途(適應症)】

緩解胃酸及膽汁反流入食道中所產生之疼痛。

3【使用上注意事項】

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 2歲以下。

3.1.2 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 消化道潰瘍的人。

3.2.2 須限鹽飲食的人。

3.2.3 有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫的人。

3.2.4 兩歲至六歲以下。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女。

3.3.2 與其他藥品併用時。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量。

3.4.4 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。

- 3.4.5 如長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
- 3.4.6 腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒：會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。
- 3.4.7 可能引起腹脹、打嗝。
- 3.4.8 使用前須搖勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
- 3.4.9 本藥成分(Alginate)不會被腸胃道吸收，因此哺乳婦女可以服用。
- 3.4.10 本藥為物理性的藥物治療方式，藥物過量的危險性極低，是一種有效的保守療法，但仍可能有腹脹等腸胃道副作用。

4【用法用量】

年齡	每次服用量	一日服用次數
12歲以上	10 - 20 毫升	一天 3 - 4 次， 飯後及睡前服用， 服用前請搖勻
6 - 12 歲	5 - 10 毫升	
2 - 6 歲	5 - 10 毫升 使用前請洽醫師診治	
2歲以下	不建議使用	

5【警語】

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

部位	副作用
腸胃道	腹脹、打嗝、腹瀉

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

- 5.2.1 若有任何不適情況產生。
- 5.2.2 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

6【包裝】4000 毫升以下HDPE塑膠瓶裝、鋁箔袋裝。

7【儲存方式】

- 7.1 置於25°C 以下，並無需冷藏。
- 7.2 塑膠瓶裝開封後請放置於溫度25°C 以下，未用完之部分需於30天內丟棄。
- 7.3 鋁箔袋裝開封後未用完應丟棄。

8【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

9【劑型】懸液劑，口服乳白色至乳黃色懸浮液，薄荷口味。

10 經銷商資訊：吉泰藥品股份有限公司
 台北市敦化南路二段128號15之6
 諮詢專線：0800-000-016

藥商/製造廠：臺灣汎生製藥廠股份有限公司
 高雄市鳥松區空埔里大同路5-1號及高雄市鳥松區空埔里神農路330號

